


Comment venir au CLAT ?



Comment nous contacter ?

Par téléphone

02 48 48 49 90 / Fax : 02 48 48 57 02

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Par mail

clat@ch-bourges.fr

Par courrier


CLAT

Centre Hospitalier Jacques Coeur

145 avenue François Mitterrand

CS 30010

18020 Bourges Cedex



Centre Hospitalier Jacques Coeur - Direction de la communication / CLAT - Mars 2021



145 avenue François Mitterrand
18020 Bourges Cedex



Ligne B : Foulonne/Hôpital
Arrêt Hôpital
Ligne C : Saint Doulchard/Hôpital
Arrêt Hôpital



Centre Hospitalier Jacques Coeur

145 avenue François Mitterrand

18020 Bourges Cedex


CLAT 18

Centre de Lutte
Antituberculeuse

Le BCG

Zones géographiques à forte incidence tuberculeuse

(estimation OMS 2006) :



- Continent Africain dans son ensemble.
- Continent asiatique dans son ensemble, (à l'exception du Japon et de la Turquie) y compris pays du Proche et Moyen Orient (à l'exception de Chypre, des Emirats Arabes Unis, d'Israël, de la Jordanie et d'Oman)
- Amérique Centrale et du Sud (à l'exception d'Antigua-et-Barbada, Barbade, Bermudes, Bonaire, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Jamaïque, Iles Vierges et Caïmans, Porto Rico)
- Europe Centrale et de l'Est, y compris pays de l'Ex-URSS
- Union Européenne : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie,
 - Guyane, Mayotte

La vaccination

La vaccination par le BCG permet d'éviter les formes graves de la tuberculose chez l'enfant (méningite et septicémie).

Elle concerne les enfants...

- Nés dans un pays de forte endémie
- Ayant un parent né dans un de ces pays
- Ayant des contacts réguliers avec des personnes originaires dans un de ces pays
- Devant séjourner plus d'un mois dans un de ces pays
- Ayant des antécédents familiaux de tuberculose
- Résidant en Ile de France, en Guyane, à Mayotte
- Dans certaines situations à la demande du Médecin
- A la demande des parents

Le vaccin se fait...

- A partir des 1 mois de l'enfant et jusqu'à 15 ans
- Seul le CLAT 18 dispose du vaccin BCG
- 1 mois minimum avant le voyage en pays endémique
- Sous certaines conditions (contre-indications vaccinales ponctuelles possibles)

En France,
5000 cas de tuberculose
sont encore déclarés
chaque année
avec de grandes variations
régionales

Depuis le 1^{er} juillet 2007, le vaccin n'est plus obligatoire pour tous